



Liste des espèces indigènes de haies

Buissons épineux

| Nom commun | Nom latin | Hauteur | Milieus | Humidité | Ensoleillement | Croissance | Remarque |
|----------------------------|---------------------------|-------------|--|----------|----------------|------------|--|
| Aubépine | <i>Crataegus</i> sp. | 4 – 5 m | Buissons, haies, lisières, clairières ; de la plaine jusqu'à 1200 m | Humide | Mi-ombragé | Lente | Sujet au feu bactérien : plantation seulement autorisée à plus de 1000m d'altitude dans la forêt |
| Eglantier | <i>Rosa canina</i> | 3 m | Haies, lisières, amas de pierres ; de la plaine jusqu'à 1200 m (parfois 1800 m) | Moyenne | Mi-ombragé | Rapide | Produit des fruits et fleurs mellifères |
| Epine-Vinette | <i>Berberis vulgaris</i> | 3 m | Broussailles, haies, rocailles ; de la plaine jusqu'à 1800 m | Sec | Ombagé | Lente | Peut abriter des ravageurs de céréales |
| Groseillier à maquereau | <i>Ribes uva-crispa</i> | 0.6 – 1.5 m | Haies, lisières, rocailles ; de la plaine jusqu'à 1200 m (parfois 1800 m) | Humide | Mi-ombragé | Rapide | Produit des fruits |
| Nerprun purgatif | <i>Rhamnus cathartica</i> | 3 m | Haies, lisières ; de la plaine jusqu'à 1800 m | Moyenne | Mi-ombragé | Lente | Source de nourriture pour les oiseaux |
| Prunelier | <i>Prunus spinosa</i> | 3 m | Haies, lisières ; de la plaine jusqu'à 1800 m | Moyenne | Ensoleillé | Lente | Produit des fruits, des fleurs mellifères, source de nourriture pour les oiseaux |
| Rose des champs | <i>Rosa arvensis</i> | 1 m | Forêts, lisières, haies ; de la plaine jusqu'à 1800 m | Humide | Mi-ombragé | Rapide | Source de nourriture pour les oiseaux |
| Rosier à fleurs en corymbe | <i>Rosa corymbifera</i> | 1 m | Lisières, buissons, amas de pierres ; de la plaine jusqu'à 1200 m (parfois 1800 m) | Moyenne | Mi-ombragé | Moyenne | Source de nourriture pour les oiseaux |
| Rosier églantier | <i>Rosa rubiginosa</i> | 0.5 – 3 m | Buissons, prés secs ; de la plaine jusqu'à 1200 m (parfois 1800 m) | Moyenne | Ensoleillé | Rapide | Source de nourriture pour les oiseaux |
| Rosier tomenteux | <i>Rosa tomentosa</i> | 1 – 1.5 m | Buissons, forêts de feuillus ; sols secs ; de la plaine jusqu'à 1800 m | Moyenne | Mi-ombragé | Moyenne | Source de nourriture pour les oiseaux |

Buissons bas

| Nom commun | Nom latin | Hauteur | Milieus | Humidité | Ensoleillement | Croissance | Remarque |
|-------------------------|---------------------------|-----------|---|----------|----------------|------------|--|
| Bourdaine | <i>Frangula alnus</i> | 1-3 m | Aulnaies, haies, marais ; de la plaine jusqu'à 1200 m | Humide | Mi-ombragé | Rapide | Planter uniquement dans les milieux humides |
| Chèvrefeuille des haies | <i>Lonicera xylosteum</i> | 2 m | Forêts, lisières, buissons, haies ; de la plaine jusqu'à 1200 m (parfois 1800 m) | Humide | Mi-ombragé | Moyenne | Peut abriter des ravageurs de cerisiers |
| Cornouiller sanguin | <i>Cornus sanguinea</i> | 4 m | Haies, forêts, buissons, lisières ; de la plaine jusqu'à 1200 m (parfois 1800 m) | Humide | Mi-ombragé | Lente | Assez compétitif, produit des fleurs mellifères |
| Coronille | <i>Hippocrepis emerus</i> | 0.5 – 2 m | Forêts claires, buissons, pierriers ; favorise plutôt les endroits secs et chauds ; de la plaine jusqu'à 1200 m | Sec | Mi-ombragé | Lente | Enrichit le sol en azote |
| Fusain d'Europe | <i>Euonymus europaeus</i> | 1 – 5 m | Haies, forêts, lisières ; de la plaine jusqu'à 1200 m | Humide | Mi-ombragé | Lente | Source de nourriture pour les oiseaux |
| Noisetier | <i>Corylus avellana</i> | 5 m | Taillis, lisières ; de la plaine jusqu'à 1800 m | Moyenne | Mi-ombragé | Rapide | Assez compétitif, peut abriter des ravageurs de vergers, produit des fruits et des fleurs mellifères |
| Sureau noir | <i>Sambucus nigra</i> | 7 m | Haies, buissons ; souvent cultivé ; de la plaine jusqu'à 1200 m | Humide | Mi-ombragé | Rapide | Produit des fruits et des fleurs mellifères, source de nourriture pour les oiseaux |
| Sureau rouge | <i>Sambucus racemosa</i> | 4 m | Haies, pierriers ; de 700 m à 1800 m (parfois aussi en plaine) | Humide | Mi-ombragé | Rapide | Produit des fruits et des fleurs mellifères, source de nourriture pour les oiseaux |
| Troène vulgaire | <i>Ligustrum vulgare</i> | 4 m | Lisières, buissons ; favorise plutôt les endroits chauds ; en plaine (parfois jusqu'à 1200 m) | Moyenne | Mi-ombragé | Rapide | Produit des fleurs mellifères |
| Viorne lantane | <i>Viburnum lantana</i> | 5 m | Haies, buissons, lisières ; de la plaine jusqu'à 1200 m (parfois 1800 m) | Sec | Mi-ombragé | Rapide | Produit des fleurs mellifères |
| Viorne obier | <i>Viburnum opulus</i> | 4 m | Haies, forêts riveraines, lisières, buissons ; de la plaine jusqu'à 1200 m | Humide | Mi-ombragé | Rapide | Produit des fleurs mellifères, source de nourriture pour les oiseaux |

Arbustes

| Nom commun | Nom latin | Hauteur | Milieus | Humidité | Ensoleillement | Croissance | Remarque |
|-----------------------|-------------------------|---------|---|-------------|----------------|------------|---|
| Aulne blanc | <i>Alnus incana</i> | 15 m | Rives, forêts humides ; de la plaine jusqu'à 1200 m (parfois 1800 m) | Très humide | Mi-ombragé | Rapide | Source de nourriture pour les oiseaux, bois de feu |
| Aulne noir | <i>Alnus glutinosa</i> | 20 m | Rives, forêts humides ; de la plaine jusqu'à 1200 m | Très humide | Mi-ombragé | Rapide | Source de nourriture pour les oiseaux, bois de feu |
| Bouleau | <i>Betula pendula</i> | 25 m | Zones riveraines, tourbières, forêts; de la plaine jusqu'à 1800 m | Moyenne | Ensoleillé | Rapide | Produit des fleurs mellifères |
| Charme | <i>Carpinus betulus</i> | 20 m | Forêts ; en plaine (parfois jusqu'à 1200 m) | Humide | Ombagé | Rapide | Faible valeur écologique |
| Erable champêtre | <i>Acer campestre</i> | 15 m | Forêts, haies ; souvent planté ; de la plaine jusqu'à 1200 m | Moyenne | Mi-ombragé | Lente | Produit des fleurs mellifères et du fourrage |
| Saule Marsault | <i>Salix caprea</i> | 9 m | Forêts riveraines, clairières, lisières, gravières, décombres ; de la plaine jusqu'à 1800 m (parfois au-dessus de 1800 m) | Humide | Mi-ombragé | Rapide | Produit des fleurs mellifères et du bois de feu |
| Merisier | <i>Prunus avium</i> | 25 m | Lisières, forêts, haies ; de la plaine jusqu'à 1200 m (parfois 1800 m) | Humide | Mi-ombragé | Rapide | Produit des fruits et des fleurs mellifères |
| Merisier à grappes | <i>Prunus padus</i> | 10 m | Forêts riveraines, lisières, sols humides ; de la plaine jusqu'à 1200 m | Humide | Ombagé | Rapide | Produit des fruits et des fleurs mellifères |
| Saule pourpré | <i>Salix purpurea</i> | 1 – 6 m | Rives, buissons, souvent planté ; de la plaine jusqu'à 1200 m | Humide | Ensoleillé | Rapide | Produit des fleurs mellifères |
| Saule blanc | <i>Salix alba</i> | 20 m | Rives, forêts riveraines ; de la plaine jusqu'à 1200 m (parfois 1800 m) | Très humide | Mi-ombragé | Rapide | Produit des fleurs mellifères et du bois de feu |
| Sorbier des oiseleurs | <i>Sorbus aucuparia</i> | 15 m | Forêts ; de 700 à 1200 m | Humide | Mi-ombragé | Rapide | Sujet au feu bactérien : plantation seulement autorisé à plus de 1000m d'altitude dans la forêt |

Arbres

| Nom commun | Nom latin | Hauteur | Milieus | Humidité | Ensoleillement | Croissance | Remarque |
|----------------------------|----------------------------|---------|---|-------------|----------------|------------|--|
| Chêne pédonculé | <i>Quercus robur</i> | 50 m | Forêts humides ; en plaine (parfois jusqu'à 1200 m) | Humide | Mi-ombragé | Rapide | Produit de la nourriture pour les oiseaux |
| Chêne sessile | <i>Quercus petraea</i> | 28 m | Pentes sèches et pierreuses, forêts; favorise plutôt les endroits secs ; en plaine (parfois jusqu'à 1200 m) | Sec | Mi-ombragé | Moyenne | Produit de la nourriture pour les oiseaux |
| Erable plane | <i>Acer platanoides</i> | 25 m | Forêts de feuillus, aulnaies ; souvent planté ; de la plaine jusqu'à 1200 m | Humide | Ombragé | Rapide | Produit des fleurs mellifères |
| Erable sycomore | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 30 m | Forêts de plaine et de montagnes, haies, pâturages ; souvent planté ; de la plaine jusqu'à 1800 m | Humide | Ombragé | Rapide | Produit des fleurs mellifères |
| Frêne | <i>Fraxinus excelsior</i> | 25-40 m | Forêts humides, haies ; de la plaine jusqu'à 1200 m | Humide | Mi-ombragé | Rapide | Tendance à l'envahissement, faible valeur écologique |
| Hêtre | <i>Fagus sylvatica</i> | 40 m | Forêts ; de 700 à 1200 m (parfois en plaine et de 1200 à 1800 m) | Humide | Très ombragé | Lente | |
| Orme de montagne | <i>Ulmus glabra</i> | 30 m | Forêts, parcs | Humide | Ombragé | Rapide | |
| Peuplier blanc | <i>Populus alba</i> | 35 m | Forêts riveraines, parcs, généralement cultivé ou subspontané ; en plaine | Humide | Ensoleillé | Rapide | Produit des fleurs mellifères |
| Peuplier noir | <i>Populus nigra</i> | 30 m | Forêts riveraines, parcs, souvent cultivé ; de la plaine jusqu'à 1200 m | Très humide | Mi-ombragé | Rapide | Produit des fleurs mellifères |
| Tilleul à petites feuilles | <i>Tilia cordata</i> | 30 m | Forêts, pentes broussailleuses ; de la plaine jusqu'à 1200 m | Moyenne | Ombragé | Lente | Produit des fleurs mellifères |
| Tilleul à larges feuilles | <i>Tilia platyphyllos</i> | 40 m | Forêts ; de la plaine jusqu'à 1200 m | Humide | Ombragé | Lente | Produit des fleurs mellifères |
| Tremble | <i>Populus tremula</i> | 20 m | Forêts, lisières, buissons ; de la plaine jusqu'à 1800 m | Humide | Ensoleillé | Rapide | Produit des fleurs mellifères |

Conifères / à feuillage persistant :

Les conifères sont plus adaptés à des altitudes supérieures à 1000 m.

| Nom commun | Nom latin | Hauteur | Milieus | Humidité | Ensoleillement | Croissance | Remarque |
|---------------|---------------------------|---------|---|-------------|----------------|------------|--|
| Epicéa | <i>Picea abies</i> | 50 m | Forêts à sol acide ; de 700 à 1800 m (parfois aussi en plaine) | Humide | Très ombragé | Rapide | Faible valeur écologique |
| Genévrier | <i>Juniperus communis</i> | 3 m | Forêts, pentes sèches, pierriers ; de la plaine jusqu'à 1200 m (parfois 1800 m) | Sec | Ensoleillé | Lente | Peut abriter des ravageurs de poiriers |
| Houx | <i>Ilex aquifolium</i> | 10 m | Forêts, surtout hêtraies, chênaies, endroits non exposés ; de la plaine jusqu'à 1200 m | Moyenne | Ombragé | Lente | Source de nourriture pour les oiseaux |
| If | <i>Taxus baccata</i> | 20 m | Pentes boisées, ombragées, gorges; souvent cultivé ; de la plaine jusqu'à 1200 m (parfois 1800 m) | Moyenne | Ombragé | Lente | Source de nourriture pour les oiseaux |
| Pin sylvestre | <i>Pinus sylvestris</i> | 40 m | Forêts, rochers, alluvions, souvent pionnier sur sols maigres ; de la plaine jusqu'à 1800 m | Moyenne | Ensoleillé | rapide | Faible valeur écologique |
| Sapin | <i>Abies alba</i> | 60 m | Forêts à sol profond ; de la plaine jusqu'à 1200 m (parfois 1800 m) | Très humide | Très ombragé | Lente | Faible valeur écologique |